



Informatie Folder voor de Narcose

Uw kind krijgt binnenkort een behandeling onder narcose. Met deze folder willen wij u nuttige informatie geven over de dagopname van uw kind.

Planning van de behandeling:


- Van de planningsafdeling zult u de datum van de behandeling doorkrijgen. De exacte tijd wordt 1 a 2 dagen van tevoren telefonisch aan u medegedeeld. U wordt verzocht om minimaal 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Vorbereidingen thuis voor de narcose:

Op de dag van de behandeling gelden voor de narcose de volgende regels:

- Behandeling voor 12.00u: dan mag uw kind niet meer eten na 00.00 de avond tevoren.
- Behandeling na 12.00u: dan mag uw kind om 06.00u in de ochtend 1 beschuitje eten.
- Tot 2 uur voor de operatie mag uw kind alleen water of thee (zonder melk) drinken. Dus de overige dranken zoals melk of frisdranken mogen niet worden genuttigd.
- Als uw kind al een partiële gebitsprothese heeft dan dient deze te worden verwijderd voordat de behandeling onder narcose wordt gestart.
- Kunst of gel-nagels moeten op minimaal 1 vinger verwijderd zijn.
- Nagellak moet minstens op 1 vinger verwijderd zijn.
- Alle sieraden en piercings (ook in de mond) het liefst thuis al af doen
- Geen make-up dragen.





Het niet opvolgen van deze adviezen kan vergaande nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van uw kind tijdens de behandeling onder narcose. Het is dus geheel in het belang van de gezondheid van uw kind dat u zich strikt aan deze voorschriften houdt. De behandeling onder narcose zal, om uw kind geen onnodige risico's te laten lopen voor de gezondheid, niet worden uitgevoerd als blijkt dat met name de voorschriften wat betreft de nuchtertijden niet zijn nageleefd. Meer informatie over de achtergronden en het belang van nuchter zijn voor de narcose kunt u bekijken op deze video:

<https://www.youtube.com/watch?v=B2Pck2EVWql&t=39s>

De narcose:

Hier volgt een korte uiteenzetting van de stappen die gevolgd zullen worden voor de behandeling onder narcose:

De screening:

Alvorens uw kind onder narcose behandeld kan worden dient u een uitgebreide medische vragenlijst in te vullen zodat de anesthesioloog de gezondheidstoestand van uw kind goed kan inschatten om zo de eventuele risico's voor uw kind zo laag mogelijk te houden. Zo nodig kunnen er ook aanvullende onderzoeken aangevraagd worden (denk b.v. aan bloed laten prikken) of kan er aanvullende informatie opgevraagd worden bij de huisarts of behandelende specialist.

Pas nadat alle nodige gegevens binnen zijn en beoordeeld door de anesthesioloog kan er goedkeuring gegeven worden voor de behandeling onder narcose. Als de risico's voor de gezondheid van uw kind te hoog blijken, dan kan het zijn dat de anesthesioloog de behandeling onder narcose afkeurt. U dient er rekening mee te houden dat dit ook bij uw kind kan gebeuren.

Monitoring:

Vlak voordat uw kind onder narcose gaat wordt uw kind aangesloten aan de monitor. Uw kind krijgt stickers op de borst voor de hartritme controle, een bloeddrukbandje om die om de paar minuten de bloeddruk zal meten en een dopje op de vinger om het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Pas nadat deze dingen aangesloten zijn kan de anesthesie starten.



Inbrengen infuus:

Omdat wij totaal intraveneuze anesthesie (TIVA) toepassen dient er eerst een infuus ingebracht te worden. Dit betekent dat uw kind een prikje zal krijgen in de hand of onderarm en dat de anesthesiemiddelen rechtstreeks in de bloedbaan zullen worden toegediend. Als uw kind erg tegen het prikje opziet of angstig is voor het prikje dan kunnen wij als u dat van tevoren aangeeft uw kind eerst doezelig maken met een kapje met lachgas alvorens wij het infuus prikken, zodat uw kind het prikje niet bewust meemaakt. Wij kunnen uw kind helaas niet helemaal onder narcose brengen met het kapje, maar net voldoende doezelig maken zodat het prikje niet bewust wordt meegemaakt. Er dient te allen tijde een infuus geprikt te worden.



Narcosemiddelen:

De middelen die wij gebruiken voor de narcose zijn de uiterst moderne, zeer kortwerkende middelen propofol en remifentanyl. Deze middelen werken zo kort dat na het staken van de toediening uw kind zeer snel weer wakker is en zeer weinig kans heeft op het ervaren van vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid en braken.



De narcose:


Nadat alle monitoring is aangesloten zal via het infuus langzaam de narcosemiddelen worden toegediend. Dit kan een wat prikkend of brandend gevoel in de hand of in de arm geven. Dit kan geen kwaad en trekt vanzelf weer weg. U (1 ouder) mag bij uw kind zijn en de hand vasthouden totdat uw kind in slaap valt. Ook mag u hem als dat wenselijk is op uw schoot vasthouden totdat hij in slaap valt. Vlak voordat uw kind wegdoezelt krijgt uw kind nog een kapje voor met zuurstof. Daarna gaat uw kind lekker slapen. Op dat moment zullen wij het kind van u overnemen en vragen u plaats te nemen in de wachtruimte. Zodra de behandeling klaar is maken wij uw kind weer wakker en mag u er weer meteen bij.

Aangezien wij geheel niet met spierverslappers werken is het volledig uitgesloten dat uw kind tijdens de behandeling wakker wordt maar niet kan bewegen (zoals in sommige films). Hier hoeft u zich dan ook geheel geen zorgen over te maken.



Buisje in de neus en keel:

Nadat uw kind slaapt wordt er een buisje via de neus/mond en keel ingebracht zodat we gedurende de behandeling zuurstof kunnen toedienen. Aangezien uw kind al helemaal onder narcose is voordat dit gebeurt en het buisje wordt verwijderd voordat uw kind weer wakker is, merkt uw kind hier zelf verder helemaal niets van. Het enige wat uw kind zou kunnen merken is dat hij/zij na de behandeling wat irritatie kan ervaren op de slijmvliezen van de neus/mond en keel en last kan hebben van wat bloed uit de neus of een zwaar of kriebelig gevoel achter in de keel omdat er dus lichaamsvreemd materiaal door de neus en keel van uw kind is gegaan. Als u wilt zien hoe inbrengen van het buisje wordt uitgevoerd dan kunt u naar de volgende beelden kijken: <https://www.youtube.com/shorts/OD7RS9fWi0Q>



Bijkomen na de narcose:

Nadat de behandeling klaar is wordt uw kind wakker op de behandelstoel/tafel. Nadat uw kind wakker wordt, wordt uw kind met behulp van een rolstoel overgebracht naar een kamer waar uw kind in een relaxstoel nog rustig even bij kan komen. Zodra uw kind wakker is mag u er direct bij zijn en blijven totdat uw kind voldoende bij is gekomen om naar huis te gaan. De anesthesioloog zal regelmatig langs lopen om te bepalen of uw kind daar klaar voor is.



Mogelijke risico's van de narcose:

De anesthesie is vandaag de dag het veiligste specialisme binnen de geneeskunde met de laagste risico's. Het is zelfs zo veilig, dat het rijden met de auto naar de kliniek gevaarlijker is dan narcose krijgen in de kliniek. Toch zijn er een aantal risico's die hierna kort zullen worden opgesomd:

- Tijdens de narcose wordt er m.b.v. instrumenten een buisje via de keel in de luchtpijp ingebracht. Tijdens het inbrengen zou er een beschadiging op kunnen treden aan een of meerdere tanden.
- In zeer zeldzame gevallen kunnen er tijdens de narcose complicaties ontstaan waardoor er zuurstoftekort ontstaat met hersenbeschadiging als gevolg.
- Onder narcose verdwijnen sommige beschermende reflexen, waardoor zure maaginhoud omhoog zou kunnen komen en in de longen lopen. Hierdoor kan er een ernstige longontsteking ontstaan. Vandaar ook dat het zeer belangrijk is dat u zich absoluut aan de nuchter tijden houdt zoals hierboven is beschreven. U verkleint hiermee de kans op complicaties aanzienlijk. In het volgende filmpje wordt nog eens het belang van nuchter zijn voor de narcose duidelijk uitgelegd:
<https://www.youtube.com/watch?v=B2PcK2EVWql&t=39s>
- Er kunnen bloeddrukschommelingen ontstaan door de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen zeer goed opvangen.
- Er kan een allergische reactie ontstaan na het inspuiten van de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen zeer goed opvangen.
- Er kunnen hartritmestoornissen ontstaan door de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen en apparatuur zeer goed opvangen.
- Er kan, als de patiënt daar gevoelig voor is, een astma-aanval ontstaan door het inbrengen van het buisje in de luchtpijp. Wij kunnen dit met medicijnen zeer goed opvangen. Wel is het belangrijk dat eventuele medicijnen die uw kind gebruikt voor de longen (zoals pufjes) de dagen en ochtend voor de behandeling altijd goed in laat nemen en de medicijnen ook altijd meeneemt op de dag van de behandeling.
- Uw kind kan na de narcose enige misselijkheid ervaren of zelfs braken. Wij kunnen dit met medicijnen over het algemeen zeer goed opvangen.

Na de behandeling:

Zodra uw kind voldoende bij is gekomen en de anesthesioloog goedkeuring heeft gegeven mag u samen met uw kind naar huis. Het verdient aanbeveling om uw kind de eerste 24 u niet alleen te laten.

Behoeftte aan persoonlijk contact na he lezen van deze informatiefolder:

Mocht u na het lezen van deze informatiefolder alsnog vragen hebben of de behoefte aan persoonlijk contact met de anesthesioloog, maak dit dan kenbaar aan de praktijk waar uw kind behandelt zal worden dan zal de anesthesioloog contact met u opnemen.